

Spores d'un brun violet, ovales, courtes, obtuses à chaque extrémité, munies d'un ou deux nucléus punctiformes. — Cette espèce est connue à Nantes sous le nom de Champignon rose des landes. Elle est très-répandue dans les bruyères; sa consistance est ferme, son goût fin et délicat, ce qui la fait rechercher des gourmets, qui en général la préfèrent au véritable *Agaricus campestris*.

3° Sous le nom d'*Agaricus leimophilus* Genev., nous désignons une espèce qui paraît distincte des deux précédentes. Son port rappelle très-exactement la figure de l'*Ag. attenuatus* de la planche 632 de Letellier, espèce avec laquelle d'ailleurs elle n'a aucun autre rapport.

Son chapeau, d'abord convexe, devient plan; il est blanc, lisse, à peluchures fibrilleuses très-apprimées, de 4 à 6 centim. de diamètre, à bords très-minces, *teinté au centre d'un jaune assez vif*. Chair blanche, ne dépassant pas 5 millim. d'épaisseur. Feuilletts d'un rose pâle, noircissant promptement. Spores brunes, ovales, munies d'un large nucléus transparent, quelques-unes finement apiculées, d'autres obtuses. Stipe blanc, lisse, plein, courbé et atténué à la base, de 5 à 10 millim. de diamètre, de 3 à 4 centim. de hauteur. Anneau mince, très-rapidement évanescent, de sorte que tous les individus développés en paraissent dépourvus. — Il croît dans les prairies et les pâturages, et son port très-spécial le distingue, à première vue, des précédents. Il est plus précocé et dure moins longtemps que l'*Agaricus campestris*; chaque année il en est vendu d'assez grandes quantités sur nos marchés, mais il est ordinairement passé à la mi-octobre. Quoique sa chair soit mince et molle, il jouit d'une grande vogue auprès des amateurs, qui le nomment le petit Champignon des pâturages.

4° La quatrième forme apportée à la halle est, *pro parte*, l'*Agaricus arvensis* Schœff. tab. CCCXI (non tab. CCCX). — [Bull. tab. 514, f. N. O.] — L'*Ag. arvensis* Cord. [*Champ. de Fr.* p. 88, tab. XX, f. 2] est une plante différente qui appartient à l'espèce suivante. — Fries [*Hym. europ.* p. 278] a compris dans son *Ag. arvensis* la plante de Schœffer et l'*Ag. xanthodermus* dont nous nous occuperons bientôt; la preuve en sera fournie par les figures qu'il cite, et par la description qu'il en donne.

Champignon compacte, *d'abord globuleux, d'une forme phalloïde*, à stipe aussi gros que le chapeau, puis convexe, étalé, de 10 à 15 centimètres de diamètre, blanc, à fibrilles fines, peu visibles. Chair blanche, ferme, immuable, de 2 à 3 centimètres d'épaisseur. Feuilletts étroits, d'un rose très-pâle ou carnés, égalant à peine la moitié de l'épaisseur de la chair. Anneau large, blanc, persistant. Stipe blanc, ferme, plein, finement écailleux, gros, épais de 3 à 4 centim. de diamètre et 9 à 11 de hauteur. Spores d'un brun violet, ovales, légèrement *échancrées* d'un côté; nucléus bien prononcé. La forme spéciale des spores, un peu en croissant, est un caractère important qui éloigne complètement cette plante des précédentes. — Ce Champignon assez répandu aux environs de Nantes, est connu ici sous le nom d'*anisé*; il est comestible, mais lourd et de digestion difficile, et ne saurait, comme goût, supporter aucune comparaison avec les trois espèces précédentes. Sa chair est tellement ferme, qu'il n'est que bien rarement attaqué par les vers.

5° Une cinquième espèce enfin, très-répandue dans tout le département de la Loire-Inférieure, et que, malgré des qualités peu recommandables,