

lamellis rotundato-liberis, latis, fragilibus, obscurioribus, ab hymenophoro facile secedentibus. \*

*Hab.* in silvis frondosis Europae et Sibiriae. — Statura admodum varium; specimina a Fries et Viviani lecta robusta. Stipes obesus, basi a mycelio floccoso, compacto, albo peronatus, ut videre licet in *A. romaleo* Lötell. t. 644, qui, colore excepto, nostrum haud male refert. Sporae 6-7 = 4. Bulliardi fungus gracilis est et Friesiano longe tenuior.

158. **Tricholoma panæolum** Fr. Epicr. p. 49, Icon. t. 36, f. 2, Hym. Eur. p. 73, Cooke Ill. t. 67, Bern. Roch. t. IX, f. 2-3, *Ag. cetypus* Secr. n. 636. — Pileo spongioso-compacto, convexo-plano, maculis griseo-pruinosis variegato saepeque guttato, margine inflexo, repando; stipite solido, brevi, fibroso-striato; lamellis arcuato-adnatis, subconfertis, griseis vel sordide rufescentibus.

*Hab.* ad terram locis graminosis in regionibus campestribus, Europae, serotinum. — Minus, sed firmum, tenax, elasticum, odore et sapore non ingratum; colore pilei fuligineo pruina quasi marmorato tetricum. Sporae 5 = 3. Insignis varietas est: \* **Tr. Calceolus** Sterb. t. 6, E. F. G. Fr. Hym. Eur. pag. 73. Pileo spongioso, difformi, ovali repandoque, opaco, atomis innatis pruinosis griseo-variegato, margine infracto, nudo; stipite solido, excentrico, fusiformi, brevissimo; lamellis arcuato-adnexis, confertis, fuligineis. In coryletis Europae raro. Pileus griseo-fuligineus vel carneo-griseus, altero latere in calceoli formam productus, altero incisus, disco supra stipitem depresso. Lamellae 6-8 mm. latae; sporae 8 = 5-6.

159. **Tricholoma Crista** Fr. Epicr. p. 50, Hym. Eur. p. 73. — Pileo carnoso, tenui, molli, convexo-expanso, nudo, margine inflexo, levi, subrepando, glabro; stipite solido, curto, glabro, subaequali; lamellis rotundatis, latis, confertis, transverse venosis, albis, tritis rubellis.

*Hab.* in fagetis apricis Europae raro; ad lacum Bolmen Smølandiae. Praecedenti simile, sed album, non emerescens; odor carnis assatae. — Stipes carnosus, 4-5 cm. longus, 13 mm. crassus, levis; pileus 5-8 cm. latus, albus, subalutaceus, disco subobscuriore, carae scissili alba; sporae 10-12  $\mu$ . longae (Quélet). — \* **Tr. evenosum**. Cfr. Bresad. F. Trid. pag. 44, t. XLVIII; pileo carnoso e convexo expanso, late umbonato, glabro, subnudo, in sicco nitente et cute areolato-diffracta, albido, centro alutaceo-stramineo, 5-8 cm. lato; lamellis confertis, albis, sinuato-uncinatis, ab hymenophoro facile secedentibus; stipite solido aequali, albo, fibril-